



糖尿病網膜症について①

糖尿病網膜症と一言
 言っても、その症状は
 多彩です。今回から数回
 に分けて判りやすく解
 説していきます。

「糖尿病網膜症で何度
 も注射しています」と言
 われることがあります。
 これは糖尿病網膜症に
 黄斑浮腫(物を見る中心
 の網膜が腫れている状態)
 低下を来します。



伊藤 勇
 保谷伊藤眼科院長
 大学院で最先端の眼科医
 療に携わってきた眼科専門医。
 地域の医院との連携を積極的
 に図っている。

を併発している状況が
 予想されます。

高血糖により、血管の
 内皮細胞が障害されて
 血管収縮し詰まりやす
 くなります。十分な栄養
 が行き渡らなくなった
 目の中は、新しい血管を
 求めて信号(血管内皮細
 胞促進因子:VEGF)を
 出し始めます。しかし、こ
 れらの信号をな
 かったものにするのが、
 抗VEGF抗体ですが、
 効果は1〜3カ月程度
 で、何度も注射するとか
 かなりの金額となります。

やはり血糖コント
 ロールが最善の治療で
 す。

☎ 042-439-8123
 西東京市北町 1-6-1
 レッツビルディング 3F
<http://www.itoganka.com/>
 ■科目：網膜硝子体疾患手術、緑内障手術
 白内障手術、眼科一般診療
 ■時間：水・土曜午後、日曜、祝日は休診
 ※緊急手術は随時対応 ※月・金曜午後は予約優先

	月	火	水	木	金	土	日
9:30~12:30	○	○	○	手術	○	○	／
14:00~17:00	検査・診療	手術	／	手術	検査・診療	／	／