

伊藤先生の

街かど診療室

Q & A

「ICL」による  
屈折矯正手術

近視の際の屈折矯正法として、眼鏡は基本的な位置づけになります。

眼鏡さえあれば問題ないという人もいますが、運動時の眼鏡の煩わしさや実際と見え方のギャップが気になる方はコンタクトレンズを

選択します。しかし、コ

が故にドライアイの発

生率が高率となります。

また、ギラツキ感や眩し

さを感じる方もいます。

当然、コンタクトレン

ズを目の中に入れるこ

とも考えられ、実際に施

された際には引き抜く

だけ良いと謳われて



**伊藤 勇**  
保谷伊藤眼科院長  
大学病院で最先端の眼科医療に携わってきた眼科専門医。地域の医院との連携を積極的に図っている。

「ICL」(Implantable contact Lens)です。目の中にコンタクトレンズを挿入するのですが、このコンタクトレンズに絶妙なHorie

「穴」が開いており、これが眼内コンタクトレンズを起因とする緑内障発作の予防となります。また、生体適合性の高いレンズ、レーシック、フェイキックO.L.等

はありますが、気にする人はほとんどおりません。このICLを最初に知った6年前から非常に興味を覚え、実際に手術している多くの先生方にインタビューして

はありますが、気にする人はほとんどおりません。このICLを最初に知った6年前から非常に興味を覚え、実際に手術している多くの先生方にインタビューして

はありますが、気にする人はほとんどおりません。このICLを最初に知った6年前から非常に興味を覚え、実際に手術している多くの先生方にインタビューして

はありますが、気にする人はほとんどおりません。このICLを最初に知った6年前から非常に興味を覚え、実際に手術している多くの先生方にインタビューして

はありますが、気にする人はほとんどおりません。このICLを最初に知った6年前から非常に興味を覚え、実際に手術している多くの先生方にインタビューして

はありますが、気にする人はほとんどおりません。このICLを最初に知った6年前から非常に興味を覚え、実際に手術している多くの先生方にインタビューして

☎ 042-439-8123  
西東京市北町 1-6-1  
レッツビルディング 3F  
http://www.itoganka.com/

■科目：網膜硝子体疾患手術、緑内障手術  
白内障手術、眼科一般診療

■時間：土曜午後、木・日曜、祝日は休診  
※緊急手術は随時対応 ※月・水曜午後は予約優先

	月	火	水	木	金	土	日
9:30~12:30	○	○	○	○	○	○	○
14:00~17:30	○	手術	○	手術	○	○	○

ICLは屈折矯正のメ